适用于患有绝经后骨质疏松症且骨折风险较高的女性

EVENITY®
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

在短短 12 个月内即可快速重建骨骼



准备好开启您的强健骨骼之旅了吗？

批准用途

EVENITY® 是一种处方药，用于治疗绝经后女性的骨质疏松症，此类女性有较高的骨折风险或不能使用其他骨质疏松症药物，或其他骨质疏松症药物疗效不佳。

重要安全信息

关于 EVENITY®，我需要了解哪些最重要的信息？

EVENITY 可能会引起严重的副作用，包括增加心脏病发作、中风或死于心血管（心脏或血管）问题的风险。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医疗保健提供者或寻求紧急帮助：心脏病发作的症状，可能包括：胸痛或胸闷；呼吸急促；头晕目眩；或中风的症状，可能包括：头痛；面部、手臂或腿部麻木或无力；说话困难；视力变化或失去平衡。在接受 EVENITY 治疗之前，请告知您的医疗保健提供者您是否曾患过心脏病或中风，尤其是在过去一年内是否发生过。

请参见第 8 页上的其他重要安全信息。

了解
您的风险

EVENITY®
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

不治疗绝经后骨质疏松症会进一步增加您骨折的风险。

- 绝经后，您的身体流失的骨量大于生成的骨量
- 骨质疏松症是一种隐匿的进行性疾病，这意味着如果不治疗，病情会随着时间的推移而恶化。唯一的警告信号可能是骨折
- 三分之二患有绝经后骨质疏松症且骨折风险高的女性会在一生中发生一次骨折
- 发生与骨质疏松症相关的骨折后，您在一年内再次发生骨折的可能性会增加 5 倍

了解您的风险

您存在以下风险因素越多，骨折风险就越高。

- ☐ T 评分小于或等于 -2.5
- ☐ 年龄 65 岁或以上
- ☐ 之前发生过骨折
- ☐ 有跌倒史
- ☐ 父母发生过髋部骨折
- ☐ 体重过轻
- ☐ 吸烟
- ☐ 过量饮酒（每天 3 杯或以上）
- ☐ 长期使用泼尼松等类固醇
- ☐ 糖尿病
- ☐ 风湿性关节炎



重要安全信息（续）

如果您存在以下情况，请勿接受 EVENITY® 治疗： 血钙过低；或对 romosozumab 或 EVENITY 中的任何成分过敏。

请参见第 8 页上的其他重要安全信息。

担心自己有风险？

不要等到发生骨折。立即行动，咨询医生，了解如何使用 EVENITY 重建骨骼。


了解您的骨密度评分，
知道您还有选择

是时候进行 DXA 扫描了吗？

DXA 扫描是一种快速、无痛、非侵入性程序，可以测量骨密度并提供 T 评分，以了解您的骨质疏松症严重程度以及您是否有骨折风险。

如果您被诊断患有绝经后骨质疏松症，医生可能会建议您每 1 至 2 年进行一次骨密度扫描，以监测您的治疗进展。

您的 T 评分有助于确定您骨折风险的严重程度



骨密度正常

骨密度低

骨质疏松症

骨密度 T 评分为 -2.5 或更低被定义为骨质疏松症。
评分越低，骨折风险越高。

EVENITY® (romosozumab-aqqg) injection 105 mg/1.17 mL

EVENITY 在短短 12 个月内即可快速重建骨骼

骨质疏松症患者的骨骼



未治疗

一名接受安慰剂治疗的绝经后骨质疏松症女性在第 12 个月采集的骨盆骨样本。

接受 EVENITY 治疗

一名接受 EVENITY 治疗的绝经后骨质疏松症女性在第 12 个月采集的骨盆骨样本。

仅供说明之用。在一项由 139 名绝经后骨质疏松症女性组成的子研究中，从 2 名不同的女性身上采集了骨样本。所选图片来自各组中骨质疏松程度接近平均水平的女性。

除了减缓骨质流失外，还准备采取更多措施吗？

请咨询您的医生现在是否是开始重建骨骼的时机。



重要安全信息（续）

EVENITY® 可能会引起严重的副作用。可能的严重副作用包括严重的过敏反应、低血钙、严重的颌骨问题以及异常大腿骨折。

请参见第 8 页上的其他重要安全信息。

为什么选择 EVENITY®

EVENITY 是首款也是唯一一款双向起效的骨质疏松症治疗药物

常用的骨质疏松症处方治疗有两种作用方式：抗骨吸收药可以减缓骨质流失，而促骨形成药物则有助于骨骼生长。

EVENITY 是一种独一无二的骨质疏松症治疗药物——首款也是唯一一款双向起效的药物，既可以重建骨骼，又可以帮助减缓骨质流失。



每剂 EVENITY 包含 2 次注射，由您的医生或医疗保健提供者每月在您的皮下注射。在您接受 EVENITY 治疗期间，您应该按照医生的指示服用钙和维生素 D。如果您错过预约，请尽快联系您的医生重新安排。

EVENITY® (romosozumab-aqqg) injection 105 mg/1.17 mL

开始使用 EVENITY



1=2

剂量　　注射

每剂 EVENITY 包含 2 次注射

每月给药

EVENITY 每月在您就诊时注射

12

个月

EVENITY 仅注射 12 个月

重要安全信息（续）

EVENITY 的最常见副作用是关节疼痛和头痛。


请参见第 8 页上的其他重要安全信息。

除了减缓骨质流失外，还准备采取更多措施吗？

请咨询您的医生现在是否是开始重建骨骼的时机。

12 个月
的结果

与安慰剂组相比，EVENITY 在 12 个月时显著提高了腰椎、全髋和股骨颈的骨矿物质密度*



*BMD 结果并不意味着骨折风险降低。

在之后对 7,000 多名接受了 EVENITY 或安慰剂（一种不含药物的治疗方法）治疗持续 12 个月的绝经后骨质疏松症女性进行的研究中，与接受安慰剂治疗的女性相比，接受 EVENITY 治疗的女性的腰椎、全髋和股骨颈的骨矿物质密度 (BMD) 显著增加。

EVENITY®
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

EVENITY 在短短 12 个月内即可显著降低脊椎骨折风险

在本传播图所示的同一项临床研究中，接受 EVENITY 治疗的女性在 12 个月时的新发脊椎骨折比接受安慰剂治疗的女性少。12 个月时，除脊椎外其他骨折的减少并不明显。

接受 EVENITY 治疗 12 个月后，请就以下事项咨询您的医生

- 安排 DXA 扫描以了解 EVENITY 治疗后的效果
- 维持您重建骨骼所需的后续治疗

是时候开始使用 EVENITY 重建骨骼了吗？
请咨询您的医生 EVENITY 是否适合您。



重要安全信息（续）

在您接受 EVENITY 治疗期间，您应该按照医生的指示服用钙和维生素 D。

请参见第 8 页上的其他重要安全信息。

安全性


EVENITY 已在近 12,000 名女性中进行了研究

每次开始服用新药时，最好了解其可能产生的副作用。对于骨质疏松症，了解不治疗可能会增加骨折风险也很重要。与您的医生沟通，共同做出明智的决定。

一项涉及 7,000 多名女性的 EVENITY 研究

药物安全至关重要。对 EVENITY 进行研究的目的是了解使用该药物的益处和可能出现的副作用。

一项 EVENITY 研究评估了 7,000 多名接受 EVENITY 或安慰剂治疗的绝经后骨质疏松症女性。最常见的副作用是关节疼痛和头痛。这些并不是 EVENITY 的所有可能的副作用。请咨询您的医生，了解更多关于 EVENITY 潜在严重副作用的信息。请参阅以下研究中对最常见副作用的比较。



要了解更多信息，请访问 evenity.com

请参见第 8 页上的其他重要安全信息。

支付 EVENITY® 费用

EVENITY® (romosozumab-aqqg) injection 105 mg/1.17 mL

许多 Medicare 和商业计划均承保 EVENITY

每位患者的自付费用各不相同。

MEDICARE

- 大多数 Medicare B 部分患者都有附加保险，每剂 EVENITY*† 可支付 $0
- 在您达到自付额后，Medicare B 部分通常会承保您在医生诊所接受的 80% 的治疗费用
- 您可以购买附加保险（例如，Medicare 补充计划或 Medigap、商业保险、TRICARE）来支付额外的 20%‡
  - 您可能需要为这些附加保险支付额外的月保费
  - 自付费用不包括与诊所就诊或 EVENITY 施用相关的费用
- 您为 EVENITY 支付的费用取决于您拥有的 Medicare 计划类型。请咨询您的保险提供商，了解您将为 EVENITY 支付的费用

*分析了 2024 年 1 月至 2024 年 12 月的 Amgen SupportPlus 保险验证数据，以确定 OOP 分配。仅将有意向接受 EVENITY 治疗的患者纳入分析。

†您支付的金额可能取决于其他保险计划的承保范围。

‡您必须参加 Medicare A 部分和 B 部分才能通过 Medicare 补充保险 (Medigap) 获得承保。Medicare 补充保险可能需要额外的月保费。

商业保险



- Amgen® SupportPlus 共付计划可以帮助拥有私人或商业保险的患者降低自付费用
- 符合条件的商业保险受保患者可以通过 Amgen SupportPlus 共付计划支付每剂低至 $0 的费用
- 可应用于自付额、共同保险和共付额
- 适用资格标准和计划上限。请访问 www.amgensupportplus.com/copay 查看完整的条款和条件

未投保

- Amgen SupportPlus 代表可以提供有关可能能够提供帮助的独立非营利基金会的信息。§ 请致电 1-866-264-2778 联系 Amgen SupportPlus 了解更多信息

§独立非营利患者援助计划提供资源的资格取决于该非营利组织的标准。Amgen 对这些计划没有控制权，仅提供信息以供参考。



如果您不确定自己拥有哪种 Medicare 计划或正在寻找更多信息，请咨询您的保险提供商并访问 evenity.com/paying 查看更多详情。

请参见第 8 页上的其他重要安全信息。

EVENITY®
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

重要安全信息

关于 EVENITY®，我需要了解哪些最重要的信息？

EVENITY 可能会引起严重的副作用，包括增加心脏病发作、中风或死于心血管（心脏或血管）问题的风险。如果您出现以下任何症状，请立即致电您的医疗保健提供者或寻求紧急帮助：心脏病发作的症状，可能包括：胸痛或胸闷；呼吸急促；头晕目眩；或中风的症状，可能包括：头痛；面部、手臂或腿部麻木或无力；说话困难；视力变化或失去平衡。在接受 EVENITY 治疗之前，请告知您的医疗保健提供者您是否曾患过心脏病或中风，尤其是在过去一年内是否发生过。

如果您存在以下情况，请勿接受 EVENITY 治疗：血钙过低；或对 romosozumab 或 EVENITY 中的任何成分过敏。

在您接受 EVENITY 之前，请告诉您的医生您的所有医疗状况，包括如果您：

- 有其他心脏或血管疾病病史
- 有低血钙
- 无法每日补充钙和维生素 D
- 有肾脏问题或正在接受肾透析
- 计划接受牙科手术或拔牙

EVENITY 有哪些可能的副作用？

EVENITY 可能引起严重的副作用，包括：

曾有接受 **EVENITY** 治疗的患者出现过**严重的过敏反应**。如果您出现任何严重过敏反应的症状，请立即致电您的医疗保健提供者或前往最近的急诊室，包括：皮疹；荨麻疹；面部、嘴唇、口腔、舌头或喉咙肿胀，这些可能导致吞咽或呼吸困难。

血液中钙含量低（低钙血症）。EVENITY 可能会降低您血液中的钙含量。您应该先治疗低血钙后才能接受 EVENITY 治疗。如果您出现低血钙症状，请致电您的医疗保健提供者，例如：肌肉痉挛、抽搐或抽痛；手指、脚趾或口腔周围麻木或刺痛。

可能会出现重度颌骨问题（骨坏死）。您的医疗保健提供者会在您开始接受 EVENITY 治疗之前检查您的口腔，并可能会让您去看牙医。向您的医疗保健提供者或牙医咨询良好的口腔护理方法。

异常股骨骨折。此类骨折的症状包括髋部、腹股沟或股骨新发疼痛或异常疼痛。

EVENITY 的最常见副作用包括关节疼痛和头痛。

这些并不是 EVENITY 所有可能的副作用。请致电您的医生，获取有关副作用的医疗建议。

我们建议您向 FDA 报告处方药的负面副作用。请访问 www.fda.gov/medwatch，或致电 1-800-FDA-1088。

请参阅随附的 EVENITY 完整处方信息，包括内附用药指南。



EVENITY®
(romosozumab-aqqg)
injection 105 mg/1.17 mL

一些帮助您与医生开始谈话的方法：

- 如果我不治疗绝经后骨质疏松症会怎样？
- 像 EVENITY® 这样的成骨剂如何帮助降低我的骨折风险？
- EVENITY 与其他绝经后骨质疏松症治疗方法相比如何？

您也可以访问 evenity.com



通过我们的 Bone Matters® 计划获得支持。

EVENITY 患者可以在 bonematters.com 上注册，获取免费注射提醒、营养见解和保持活力的技巧

请参见第 8 页上的重要安全信息

© 2024-2025 Amgen Inc. 保留所有权利。USA-785-82940