La quimioterapia intensiva combate el cáncer. Pero también puede ponerle en riesgo de contraer una infección, lo que puede alterar su plan de tratamiento contra el cáncer.

Neulasta® Onpro® le ayuda a combatir el riesgo de infección desde casa y reduce el riesgo de hospitalización.*



Más de 1.8 millones de pacientes
han utilizado Neulasta® Onpro® en todo el mundo.

*Si por cualquier motivo, cree que no recibió su dosis completa de Neulasta® o que el inyector corporal (OBI) no funciona correctamente, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor de atención médica, debido a que una dosis incompleta podría aumentar el riesgo de infección.

Indicación
Neulasta® es un medicamento de venta con receta que se utiliza para ayudar a reducir la probabilidad de infección debido a un bajo recuento de glóbulos blancos en personas con ciertos tipos de cáncer (no mieloides), quienes reciben medicamentos contra el cáncer (quimioterapia) que pueden causar fiebre y un bajo recuento de glóbulos blancos.

Información de seguridad importante
No use Neulasta® si ha tenido una reacción alérgica grave al pegfilgrastim o filgrastim.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Neulasta® (pegfilgrastim) injection Onpro® kit

Introducción

El diagnóstico de cáncer puede ser abrumador. Si su plan de tratamiento incluye quimioterapia fuerte, esta guía puede ayudarle.

En las siguientes páginas, aprenderá cómo Neulasta® puede ayudar a reducir el riesgo de infección y cómo Neulasta® Onpro® está diseñado para que pueda quedarse en casa, sin tener que regresar a su médico para otra cita.

¿Ya utiliza Neulasta® Onpro®? Consulte la información práctica sobre el uso del producto en las páginas 12-15.

ÍNDICE

2 Introducción
3 Quimioterapia y los glóbulos blancos
4 Cómo funciona Neulasta®
5 Quédese en casa con Neulasta® Onpro®
6 Retos frecuentes
7 Su dispositivo Neulasta® Onpro®
8 Descripción general del uso de Neulasta® Onpro®
9 Cómo combatir el riesgo de infección
10 Preguntas que puede hacerle a su médico
11 Qué esperar
12 Recursos financieros
13 Cómo pagar por Neulasta® Onpro®
14 Aspectos relevantes sobre Neulasta® Onpro®
15 Información de seguridad importante

Información de seguridad importante

Antes de recibir Neulasta®, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- Tiene un trastorno de células falciformes.
- Ha tenido una reacción cutánea grave a los adhesivos acrílico.
- Es alérgico al látex. La tapa de la aguja de la jeringa precargada contiene goma natural seca (derivada del látex).
- Tiene problemas renales.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si Neulasta® puede dañar al feto.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si Neulasta® pasa a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con o sin receta, vitaminas y suplementos herbales.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Quimioterapia y los glóbulos blancos

La quimioterapia intensiva pone a su cuerpo en riesgo de infección que puede alterar sus tratamientos contra el cáncer.

La quimioterapia actúa al destruir las células de rápido crecimiento, como las células cancerosas y otras células no cancerosas del cuerpo. Uno de los efectos secundarios de la quimioterapia es que puede disminuir el número de glóbulos blancos en su organismo. Un recuento bajo de glóbulos blancos puede debilitar el sistema inmunitario, lo cual aumenta el riesgo de infección.

Acerca de la neutropenia febril y su potencial para alterar el curso de su tratamiento contra el cáncer

El recuento bajo de glóbulos blancos se denomina neutropenia. Cuando se presenta en combinación con fiebre, se denomina neutropenia febril (NF), y puede ser un signo de que tiene una infección, lo cual es uno de los efectos secundarios más graves de la quimioterapia intensiva.

Cómo funciona Neulasta®

Pegfilgrastim es una inyección de factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) que se receta para prevenir la neutropenia febril (NF). Neulasta® se ha utilizado en más de 1.8 millones de pacientes en todo el mundo.* Neulasta® ofrece Onpro®, el primer sistema de inyector corporal (OBI), diseñado para administrar Neulasta® de forma automática en el momento adecuado.†

*De marzo de 2015 a marzo de 2026.


†Si por cualquier motivo, cree que no recibió su dosis completa de Neulasta® o que el inyector corporal no funciona correctamente, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor de atención médica, debido a que una dosis incompleta podría aumentar el riesgo de infección.

Neulasta® del día siguiente redujo la incidencia de NF en un 94 % y las hospitalizaciones relacionadas con NF en un 93 %.

Un estudio de 928 pacientes con cáncer de mama mostró que cuando se administra una vez en cada ciclo de quimioterapia, Neulasta® ayudó a proteger contra el riesgo de infección y redujo las hospitalizaciones. El 17 % de los pacientes que no recibieron tratamiento con Neulasta® desarrollaron infecciones, mientras que solo el 1 % de los pacientes tratados con Neulasta® desarrollaron infecciones, lo cual representa una reducción del 94 %. El 14 % de los pacientes que no recibieron tratamiento con Neulasta® fueron hospitalizados, mientras que solo el 1 % de los pacientes tratados con Neulasta® fueron hospitalizados, lo cual representa una reducción del 93 %.



en la neutropenia febril



en las hospitalizaciones relacionadas con NF

Uso de Neulasta® del día siguiente desde el primer ciclo de quimioterapia.

Un estudio realizado en pacientes con diferentes tipos de cáncer demostró que un mayor número de pacientes que recibieron Neulasta® continuaron con su régimen de quimioterapia, en comparación con aquellos que no recibieron un factor estimulante de colonias de glóbulos blancos.



Neulasta® Onpro® puede ayudar a garantizar el cumplimiento estricto de su régimen de quimioterapia.

Información de seguridad importante

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios graves de Neulasta®?

- **Rotura del bazo.** Su bazo se puede agrandar y romper mientras usa Neulasta®. La rotura del bazo roto puede causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica inmediatamente si presenta dolor en la zona superior izquierda del estómago o en la punta del hombro izquierdo.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Quédese en casa con Neulasta® Onpro®

Onpro® está diseñado para administrar automáticamente su dosis en el momento adecuado: **el día después de la quimioterapia**



Más de 1.8 millones de pacientes han utilizado Neulasta® Onpro® en todo el mundo.

Neulasta® Onpro® reduce el riesgo de neutropenia febril sin tener que volver al consultorio médico.

En la actualidad, Neulasta® Onpro® permite que la mayoría de los pacientes puedan permanecer en casa el día después de una quimioterapia intensiva. Además, es difícil para algunos pacientes regresar al consultorio médico al día siguiente para recibir Neulasta®. Olvidar una dosis de Neulasta® puede aumentar el riesgo de neutropenia febril.

Información de seguridad importante

- **Un problema pulmonar grave llamado síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS).** Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de urgencia de inmediato si presenta dificultad para respirar con o sin fiebre, problemas al respirar o frecuencia respiratoria acelerada.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Neulasta® Onpro® puede ayudar con los retos frecuentes

Para muchos pacientes, en ningún lugar se está como en casa al día siguiente de la quimioterapia. No hay motivo para volver al consultorio del médico si puede quedarse en casa. Consulte a su médico si Neulasta® Onpro® es adecuado para usted.

Neulasta® Onpro® puede ser adecuado para usted si:

- Es un adulto.
- Se siente cómodo con las Instrucciones de uso para el paciente.
- No tiene alergias a los acrílicos.

Dificultad para conseguir transporte

Para algunos, puede ser difícil conseguir transporte.

Vivir lejos

Conducir es parte del tiempo que dedica para ir a la cita con el médico.



Un traslado menos al consultorio médico

Neulasta® Onpro® se diseñó para que pueda quedarse en casa* para recibir su dosis

Mal tiempo

Evite los elementos y las condiciones peligrosas.

Quimioterapia antes de días festivos y fines de semana

Quimioterapia programada el día anterior al cierre del consultorio o centro médico

*Si por cualquier motivo, cree que no recibió su dosis completa de Neulasta® o que el inyector corporal no funciona correctamente, póngase en contacto inmediatamente con su proveedor de atención médica, debido a que una dosis incompleta podría aumentar el riesgo de infección.

Información de seguridad importante


- **Reacciones alérgicas graves.** Neulasta® puede provocar reacciones alérgicas graves. Estas reacciones pueden causar erupción cutánea en todo el cuerpo, dificultad para respirar, sibilancias, mareos, hinchazón alrededor de la boca o los ojos, frecuencia cardíaca rápida y sudoración.

Consulte la página 13 para obtener información importante adicional.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Su dispositivo Neulasta® Onpro®

Inmediatamente después de su tratamiento de quimioterapia intensiva, su proveedor de atención médica le aplicará el inyector corporal (OBI) en la piel. El inyector corporal está diseñado para administrar automáticamente su dosis de Neulasta® durante 45 minutos, aproximadamente 27 horas después de la activación. **Compruebe la luz de estado y el indicador de llenado para confirmar la administración de la dosis antes de retirar y desechar el inyector corporal como se indica en las instrucciones de uso para el paciente.**



Luz verde intermitente: El inyector corporal funciona correctamente. Esta luz parpadea más rápidamente durante la administración de la dosis.

Verde fijo (o apagado): La administración del medicamento debe estar completa. Compruebe que el indicador de llenado indique "vacío" y que no se observe adhesivo húmedo.

Rojo intermitente: Error del inyector corporal: llame a su proveedor de atención médica inmediatamente.

Recuerde: Cuando el inyector corporal emita un pitido, compruebe la luz de estado.

Audio

Si escucha un pitido en cualquier momento, revise la luz de estado. Si la luz intermitente es de color rojo, comuníquese de inmediato con su proveedor de atención médica, debido a que podría necesitar una dosis de reemplazo.

Cuando se complete la administración de la dosis, sonará un pitido largo, y la luz de estado cambiará a verde fijo.

Ventana de la cánula

Le permite ver la cánula (un tubo corto y blando) por la que pasa Neulasta® durante la administración de la dosis de 45 minutos.

Luz de estado

Almohadilla adhesiva

La almohadilla fija el inyector corporal directamente a la piel del abdomen o de la parte posterior del brazo.

Indicador de llenado

La línea negra debe estar en FULL (lleno) hasta que el inyector corporal comience a administrar la dosis de Neulasta®. La línea negra debe estar en EMPTY (vacío) cuando se complete la administración de Neulasta®.



El resumen no reemplaza las Instrucciones de uso para el paciente. Si utiliza Neulasta® Onpro®, es importante que revise las Instrucciones de uso para el paciente y llame a su médico si tiene alguna pregunta.

Información importante

Mientras el inyector corporal esté en su lugar, debe evitar lo siguiente:

- Viajar, conducir u operar maquinaria pesada durante las 26-29 horas siguientes a la aplicación del inyector corporal.
- Dormir sobre el inyector corporal o ejercer presión sobre el mismo. El inyector corporal podría no funcionar correctamente.
- Golpear el inyector corporal o quitárselo del cuerpo de manera accidental.

Consulte la página 13 para obtener información importante adicional.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Descripción general del uso de Neulasta® Onpro®

Qué esperar al usar Neulasta® Onpro®


Esta información es un resumen y no reemplaza las Instrucciones de uso para el paciente. Es importante que revise detenidamente las Instrucciones de uso para el paciente. Estas instrucciones incluyen todo lo que necesita saber sobre el inyector corporal. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su proveedor de atención médica.




Para un ajuste más seguro, su médico o enfermero puede añadir un extensor adhesivo que se ajuste alrededor del inyector corporal llamado PodPal™ si lo considera apropiado.

En el consultorio médico

El mismo día de la quimioterapia, su proveedor de atención médica preparará una zona de la piel y aplicará el inyector corporal.



Abdomen



Parte posterior de la parte superior del brazo

Aplicación del inyector corporal

Una vez que su médico confirme que el inyector corporal se aplicó correctamente en su piel, usted puede irse a casa.

Durante las siguientes 27 horas, compruebe ocasionalmente la luz de estado durante al menos 10 segundos. Si la luz de estado es verde intermitente, el dispositivo funciona correctamente.

Información de seguridad importante

Si presenta una reacción alérgica durante la administración de Neulasta®, retire el inyector corporal de Neulasta® al sujetar el borde de la almohadilla adhesiva y despegar el dispositivo. Busque ayuda médica de urgencia de inmediato.

- **Crisis de células falciformes.** Puede tener una crisis grave de células falciformes, que podría provocar la muerte, si padece un trastorno de células falciformes y recibe Neulasta®.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Cómo combatir el riesgo de infección

Haga todo lo posible para reducir el riesgo de infección

Durante una quimioterapia intensiva, usted podría estar en riesgo de sufrir una infección. Existen formas de protegerse a sí mismo.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer:

- Lavarse las manos con frecuencia con agua tibia y jabón. Esto es especialmente importante después de ir al baño y antes de cocinar y comer.
- Evitar el contacto con personas que tengan enfermedades contagiosas, como resfriados o gripe.
- Limpiar cortaduras y raspaduras de inmediato con agua tibia y jabón. Cubrir con un vendaje. Pregúntele a su médico y equipo de atención si el uso de antibióticos en crema es adecuado para usted.
- Evitar las multitudes donde los gérmenes puedan propagarse fácilmente.
- Tenga cuidado de no cortarse o lastimarse. Utilizar una máquina de afeitar eléctrica en lugar de una navaja de afeitar. Usar guantes de protección cuando realice tareas de jardinería o limpieza para evitar cortes y raspaduras.

Esté atento a los signos de infección

Es muy importante que informe a su médico o enfermero si experimenta alguno de los siguientes síntomas:

- Fiebre
- Cualquier zona nueva de enrojecimiento, sensibilidad o hinchazón
- Pus o secreción amarillenta de una lesión u otro lugar
- Nueva tos o dificultad para respirar
- Nuevo dolor abdominal (vientre)
- Temblores que pueden ir seguidos de sudoración
- Ardor o dolor al orinar
- Dolor de garganta
- Úlceras o manchas blancas en la boca

Información de seguridad importante

- **Lesión renal (glomerulonefritis).** Neulasta® puede causar daño renal. Informe a su proveedor de atención médica inmediatamente si presenta alguno de los siguientes síntomas: hinchazón de la cara o los tobillos, sangre en la orina u orina de color oscuro, u orina menos de lo habitual.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Preguntas que puede hacerle a su médico

¿Alguna pregunta? Pregúntele a su médico

Es importante que se sienta en total libertad de hablar con su médico o enfermero sobre su tratamiento en cualquier momento. Hacer preguntas puede ayudar mucho a aclarar cualquier confusión que pueda tener.

Asimismo, puede resultar útil asistir a sus citas médicas en compañía de un amigo o familiar para que le ayude a recordar la información.

Las siguientes son algunas preguntas que quizás quiera hacer:

- ¿Qué tipo de quimioterapia recibo?
- ¿Estoy en riesgo de infección?
- ¿Qué podría suceder si desarrollo una infección grave?
- ¿Debe incluirse Neulasta® en mi plan de tratamiento?
- ¿Durante cuánto tiempo tendré que usar Neulasta®?
- ¿Es Neulasta® Onpro® una opción para mí?
- ¿Mi seguro cubre Neulasta® o Neulasta® Onpro®?

Solicite hoy mismo su recipiente GRATUITO para el desecho seguro de residuos.

Visite Neulasta.com/Resources

Información de seguridad importante

- **Aumento del recuento de glóbulos blancos (leucocitosis).** Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre durante el tratamiento con Neulasta®.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Descripción general del uso de Neulasta® Onpro®



Qué esperar en casa

Mientras use Neulasta® Onpro® en casa, tendrá que hacer algunas cosas.

Compruebe la luz indicadora, escuche el pitido: compruebe la luz de estado ocasionalmente para asegurarse que destella en color verde. Su inyector corporal emitirá un pitido cuando necesite su atención.




Si la luz intermitente es roja, llame a su proveedor de atención médica inmediatamente.

El día de la administración



1. **Marque su calendario:** conozca la programación prevista para el inicio de la administración de Neulasta®. Un cuidador debe estar con usted la primera vez que reciba Neulasta® con el inyector corporal. Si el inyector corporal está en la parte posterior de su brazo, tenga siempre un cuidador con usted para monitorearlo.
2. **Inicio de la administración de la dosis:** durante la administración, la luz verde parpadeará. La administración de la dosis dura aproximadamente 45 minutos.
3. **Escuche hasta escuchar 1 pitido largo:** una vez se completa la administración de la dosis, escuchará un pitido largo y la luz indicadora cambiará a verde fijo (o se apagará).



4. **Confirme la administración de la dosis:** la línea negra en el indicador de llenado del inyector corporal estará en vacío una vez se complete la administración de la dosis.



5. **Retire el inyector corporal y deséchelo:** retire lentamente el inyector corporal y utilice el programa gratuito de recipientes para la eliminación de objetos punzantes para ayudarle a desechar el dispositivo de forma fácil y segura.

Para solicitar el recipiente GRATUITO para el desecho seguro de residuos, llame al 1-844-MYNEULASTA o visite Neulasta.com/Resources

Es importante que revise detenidamente las Instrucciones de uso para el paciente. Estas instrucciones incluyen todo lo que necesita saber sobre el inyector corporal. La información en este folleto no reemplaza las Instrucciones de uso para el paciente. Póngase en contacto con su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

Información importante

Mantenga el inyector corporal a una distancia mínima de 4 pulgadas de equipos eléctricos como teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, hornos de microondas y otros electrodomésticos comunes. Si el inyector corporal está demasiado cerca de equipos eléctricos, podría no funcionar correctamente y puede provocar que se omita una dosis de Neulasta®.

Consulte la página 13 para obtener información importante adicional.

Lea la información de seguridad importante adicional en la página 14.

Apoyo financiero

Programa de copago Amgen® SupportPlus

El Programa de copago Amgen SupportPlus puede ayudar a los pacientes elegibles con seguro médico privado o comercial a reducir los gastos de bolsillo.

- Podría pagar tan solo **$0* de su bolsillo** por cada dosis
- Se puede aplicar al deducible, coseguro y copago*
- No se requiere un nivel mínimo de ingresos.



Verifique su elegibilidad y regístrese hoy en www.AmgenSupportPlus.com/copay

*Se aplican criterios de elegibilidad y límites máximos del programa. Consulte AmgenSupportPlus.com/copay para conocer los Términos y condiciones completos.

Apoyo financiero

Sabemos que cada paciente tiene necesidades únicas. Y estamos aquí para brindar información y recursos de apoyo económico, independientemente de su situación financiera actual o del tipo de seguro médico que tenga.

¿Qué pasa si no tengo seguro médico privado o comercial (por ejemplo, adquirido como independiente o a través de un empleador)?

Amgen SupportPlus puede brindar información sobre fundaciones independientes sin fines de lucro que pueden ayudar.†

Llame a Amgen SupportPlus al (866) 264-2778, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este, para obtener más información. Visite AmgenSupportPlus.com para obtener más información.

†La elegibilidad para los recursos proporcionados por programas independientes de asistencia a pacientes sin fines de lucro se basa en los criterios de la organización sin fines de lucro. Amgen no tiene control sobre estos programas y proporciona información solo como cortesía.

AMGEN® Support+

Estamos aquí, justo cuando nos necesita

Llame a Amgen SupportPlus al (866) 264-2778, de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 8:00 p. m., hora del Este

Aspectos relevantes sobre Neulasta® Onpro®

- Consulte las Instrucciones de uso del inyector corporal para obtener información sobre el dispositivo que ha elegido su médico.
  - Conozca la hora en la que se espera que inicie la administración de la dosis de Neulasta®.
  - Evite viajar, conducir u operar maquinaria pesada durante las 26-29 horas siguientes a la aplicación del inyector corporal. Evite actividades y lugares que puedan interferir en el monitoreo durante el período de 45 minutos en el que se espera que el inyector corporal administre Neulasta®, y durante 1 hora después de la administración.
- Un cuidador debe estar presente la primera vez que reciba Neulasta® con el inyector corporal.
- Si se coloca en la parte posterior del brazo, un cuidador debe estar disponible para controlar el estado del inyector corporal.
- Si presenta una reacción alérgica durante la administración de Neulasta®, retire el inyector corporal al sujetar el borde de la almohadilla adhesiva y despegar el dispositivo. Busque ayuda médica de urgencia de inmediato.
- Solo debe recibir una dosis de Neulasta® el día que su proveedor de atención médica le indique.
- No se debe administrar la dosis de Neulasta® antes de que hayan transcurrido 24 horas desde la finalización de la quimioterapia. El inyector corporal está programado para administrar su dosis aproximadamente 27 horas después de que su proveedor de atención médica coloque el dispositivo en la piel.
- No exponga el inyector corporal a lo siguiente porque podría dañarse y usted se podría lesionar:
  - Diagnóstico por imágenes (por ejemplo, tomografía computarizada, resonancia magnética, ecografía, radiografía)
  - Radioterapia
  - Entornos ricos en oxígeno, como cámaras hiperbáricas
- Evite los escáneres de rayos X de los aeropuertos. En su lugar, solicite registro corporal manual. Tenga cuidado durante el registro corporal manual para evitar que el inyector corporal se desprenda accidentalmente.
- Mantenga el inyector corporal a una distancia mínima de 4 pulgadas de equipos eléctricos como teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, hornos de microondas y otros electrodomésticos comunes. Si el inyector corporal está demasiado cerca de equipos eléctricos, podría no funcionar correctamente y puede provocar que se omita una dosis de Neulasta®.
- El inyector corporal es solo para adultos.
- Si su inyector corporal no funciona correctamente, es posible que omita su dosis o que no reciba la dosis completa de Neulasta®. Si omite su dosis o no recibe la dosis completa de Neulasta®, puede tener un mayor riesgo de desarrollar fiebre o una infección.
- Llame a su proveedor de atención médica de inmediato, ya que puede necesitar una dosis de reemplazo, si ocurre alguna de las siguientes situaciones:
  - El inyector corporal para Neulasta® se desprende antes o durante la administración de una dosis. No vuelva a colocarlo.
  - El inyector corporal para Neulasta® presenta fugas.
  - El adhesivo en su inyector corporal para Neulasta® se humedece (satura) con líquido o gotea. Esto podría significar que Neulasta® se está filtrando de su inyector corporal para Neulasta®. Si esto sucede, es posible que solo reciba parte de la dosis de Neulasta® o que no reciba ninguna dosis.
  - La luz de estado del inyector corporal para Neulasta® parpadea en rojo.

Revise las Instrucciones de uso para el paciente para obtener instrucciones e información sobre el inyector corporal. Converse cualquier pregunta que tenga con su proveedor de atención médica. La información contenida en esta guía es tan solo un resumen. No pretende reemplazar ninguna instrucción de su proveedor de atención médica ni las instrucciones de uso que se incluyen con el inyector corporal.

Lea la información de seguridad importante en la página 14.

Información de seguridad importante

No use Neulasta® si ha tenido una reacción alérgica grave al pegfilgrastim o filgrastim.

Antes de recibir Neulasta®, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si:

- Tiene un trastorno de células falciformes.
- Ha tenido una reacción cutánea grave a los adhesivos acrílicos.
- Es alérgico al látex. La tapa de la aguja de la jeringa precargada contiene goma natural seca (derivada del látex).
- Tiene problemas renales.
- Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si Neulasta® puede dañar al feto.
- Está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si Neulasta® pasa a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con o sin receta, vitaminas y suplementos herbales.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios graves de Neulasta®?

- **Rotura del bazo.** Su bazo se puede agrandar y romper mientras usa Neulasta®. La rotura del bazo roto puede causar la muerte. Informe a su proveedor de atención médica inmediatamente si presenta dolor en la zona superior izquierda del estómago o en la punta del hombro izquierdo.
- **Un problema pulmonar grave llamado síndrome de dificultad respiratoria aguda (ARDS).** Informe a su proveedor de atención médica o busque ayuda médica de urgencia de inmediato si tiene dificultad para respirar con o sin fiebre, problemas al respirar o frecuencia respiratoria acelerada.
- **Reacciones alérgicas graves.** Neulasta® puede provocar reacciones alérgicas graves. Estas reacciones pueden causar erupción cutánea en todo el cuerpo, dificultad para respirar, sibilancias, mareos, hinchazón alrededor de la boca o los ojos, frecuencia cardíaca rápida y sudoración.

Si presenta una reacción alérgica durante la administración de Neulasta®, retire el inyector corporal de Neulasta® al sujetar el borde de la almohadilla adhesiva y despegar el dispositivo. Busque ayuda médica de urgencia de inmediato.

- **Crisis de células falciformes.** Puede tener una crisis grave de células falciformes, que podría provocar la muerte, si padece un trastorno de células falciformes y recibe Neulasta®.
- **Lesión renal (glomerulonefritis).** Neulasta® puede causar daño renal. Informe a su proveedor de atención médica inmediatamente si presenta alguno de los siguientes síntomas: hinchazón de la cara o los tobillos, sangre en la orina u orina de color oscuro, u orina menos de lo habitual.
- **Aumento del recuento de glóbulos blancos (leucocitosis).** Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre durante el tratamiento con Neulasta®.
- **Disminución del recuento de plaquetas (trombocitopenia).** Su proveedor de atención médica realizará análisis de sangre durante el tratamiento con Neulasta®. Informe a su proveedor de atención médica si presenta sangrado o hematomas inusuales durante el tratamiento con Neulasta®. Esto podría ser un signo de disminución del recuento plaquetario, lo que puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre.
- **Síndrome de fuga capilar.** Neulasta® puede causar la filtración de líquido desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos corporales. Esta afección se denomina "síndrome de fuga capilar" (CLS). El CLS puede provocar rápidamente síntomas que pueden poner en peligro la vida. Obtenga ayuda médica de urgencia de inmediato si presenta alguno de los siguientes síntomas:
  - hinchazón o tumefacción y orina menos de lo habitual
  - dificultad para respirar
  - hinchazón de la zona del estómago (abdomen) y sensación de saciedad
  - mareos o sensación de desmayo
  - sensación general de cansancio
- **Síndrome mielodisplásico y leucemia mieloide aguda.** Si tiene cáncer de mama o cáncer de pulmón, cuando se utiliza Neulasta® con quimioterapia y radioterapia, o solo con radioterapia, usted podría tener un mayor riesgo de desarrollar una afección sanguínea precancerosa llamada síndrome mielodisplásico (MDS) o un tipo de cáncer de la sangre llamado leucemia mieloide aguda (AML). Los síntomas pueden incluir cansancio, fiebre y la fácil aparición de hematomas o sangrado. Informe a su proveedor de atención médica si desarrolla estos síntomas durante el tratamiento con Neulasta®.
- **Inflamación de las arterias (arteritis).** En personas que reciben Neulasta®, puede producirse una inflamación grave de los vasos sanguíneos grandes y medianos que transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, incluida la aorta (la arteria más grande). Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si presenta fiebre, dolor de estómago (abdominal), dolor de espalda, dolor de cabeza, dolor de cuello o malestar general.

El efecto secundario más frecuente de Neulasta® es dolor óseo, así como dolor en brazos y piernas.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Neulasta®. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede informar sobre los efectos secundarios negativos a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) al 1-800-FDA-1088.

Consulte la **Información para el paciente sobre Neulasta®.**

Neulasta® solución inyectable: 6 mg/0.6 ml en una jeringa precargada de dosis única para uso manual solamente.

Neulasta® solución inyectable: 6 mg/0.6 ml en una jeringa precargada de dosis única que se empaca junto con el inyector corporal (OBI) para Neulasta® (kit Neulasta® Onpro®).

Neulasta® se administra como inyección debajo de la piel (subcutánea).

Consulte la información de seguridad importante adicional a lo largo de este folleto.

Neulasta® (pegfilgrastim) injection Onpro® kit

Para obtener más información,
visite Neulasta.com

One Amgen Center Drive
Thousand Oaks, CA 91320-1799
www.amgen.com

© 2026 Amgen Inc. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción. USA-003-81123 09/26

AMGEN

CQ Fluency

CERTIFICATION OF TRANSLATION

Project number: O-1050173
Delivered on: September 07, 2026

File Name(s) Received:
Neulasta patient brochure.pdf
File Name(s) Delivered:
Neulasta patient brochure-spu.pdf
Neulasta patient brochure-spu.docx

CQ Fluency confirms that the translation of the above-referenced document(s) has been completed by highly qualified linguists following the applicable processes and workflows of our Quality Management System (QMS), in conformance with the requirements set forth by ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and ISO 17100:2015.

As such, we hereby certify that nothing has been omitted or added, and that to the best of our knowledge and ability the Spanish (US) deliverable is an accurate representation of the English version.

Signature: Mitesh Thakur
Signer ID: IKVIHFUF17...
Printed Name: Mitesh Thakur
Title: Project Manager
Date: September 07, 2026
Reason for signing: I have reviewed and approve of the information above.

CQ Fluency, LLC

ATA Member number: 228954